

Doppelintegrale mit kartesischen Koordinaten

Aufgabe 1.

Berechnen Sie das Integral

$$\int_{y=0}^{\pi/2} \int_{x=0}^6 (x^2 + x \cos y) dx dy.$$

Aufgabe 2.

Die Funktion $z = (1 - x)e^y$ soll für $0 \leq x \leq 1$ und $-1 \leq y \leq 1$ betrachtet werden.

1. Zeichnen Sie eine Skizze.
2. Berechnen Sie das Volumen zwischen der Funktionsfläche und der xy -Ebene.
3. Schätzen Sie mit Hilfe der Skizze das Volumen nach unten und nach oben ab. Vergleichen Sie die Abschätzung mit dem Integrationsergebnis.

Aufgabe 3.

Die Menge $G = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1 \text{ und } x \leq y \leq \sqrt{x}\}$ ist ein kartesischer Normalbereich sowohl bezüglich der x - als auch der y -Achse. Das Integral

$$\iint_G xy dG$$

kann also auf zwei Arten berechnet werden. Führen Sie beide Rechnungen durch.

Aufgabe 4.

Setzen Sie für die folgenden Integrationsbereiche G die Grenzen in das Doppelintegral

$$\iint_G f(x, y) dG$$

ein, und schreiben Sie dG passend um, also als $dx dy$ oder als $dy dx$. Ist G sowohl ein kartesischer Normalbereich bezüglich der x - als auch der y -Achse, dann schreiben Sie beide Möglichkeiten auf. Skizzieren Sie die Mengen G .

1. $G = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 5 \text{ und } -2 \leq y \leq x\}$
2. $G = \{(x, y) \mid -1 \leq x \leq 2 \text{ und } -3 \leq y \leq x^2\}$
3. $G = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 2 - \cos y \text{ und } -\frac{\pi}{2} \leq y \leq \frac{\pi}{2}\}$